


ISSN 0219-9491 非卖品

MIMS




NEUROLOGY & PSYCHIATRY

神经与精神疾病用药指南

中国·2020

WWW.MIMS.COM



神经修复 营养及其相关药物



A 药物治疗 (续)

前庭抑制剂

- 药理作用: 主要通过抑制神经递质, 作用于初级到次级前庭神经元冲动传播和前庭神经核保持一定张力的神经传导通路, 发挥缓解急性期症状的作用。
- 临床应用: 主要用于眩晕持续数小时或频繁发作者, 因剧烈自主神经反应而需要卧床休息者。
通常持续应用 < 72 小时, 如果应用时间过

- 倍他司汀: 是组胺H₃受体的强拮抗剂, 可选择性增加脑、小脑、脑干和耳蜗循环, 调整内耳毛细血管的通透性; 增加颈内动脉的血流, 改善脑循环, 从而缓解眩晕; 促进内耳淋巴液的分泌和吸收, 消除内耳水肿; 平衡双侧前庭神经核放电率。
 - 适用于梅尼埃病或梅尼埃综合征, 以及BPPV复位后仍有头晕、平衡障碍的患者。
- 银杏叶提取物: 主要活性成分是黄酮类和萜

常用药物的用法用量

改善内耳微循环的药物

药物	用法用量	用药须知
倍他司汀 Betahistine	口服制剂 6-12 mg/次，每日3次。 注射剂 2-4 mg/次，每日1-2次肌注。	<ul style="list-style-type: none"> 可能出现胃肠道不适、皮肤瘙痒。个别病例出现头痛。 有消化性溃疡病史或活动性溃疡、支气管哮喘、肾上腺髓质瘤患者慎用。
银杏叶提取物 Ginkgo biloba	口服剂型 15-30 mg/次，每日3次。 注射剂型 17.5 mg/次/日，深部肌肉注射；或35-70 mg/次，每日1-2次静滴。最大剂量为87.5 mg/次，每日2次静滴。	<ul style="list-style-type: none"> 可能引起头痛、头晕，心悸，胃肠道反应，静脉输注可能引起静脉炎。 孕妇、婴幼儿禁用。 过敏体质者、心力衰竭、严重心脏疾患、肝或肾功能衰竭、血小板减少、血小板功能障碍、有出血倾向的患者，以及老年人、哺乳妇女慎用。

12
眩晕

抗组胺药

药物	用法用量	用药须知
苯海拉明 Diphenhydramine	晕动症 25-50 mg，搭乘交通工具前半小时服，以后根据需要间隔数小时重复服用。 其他眩晕、恶心和/或呕吐 根据需要25-50 mg/次，每日3-4次静注或口服。	<ul style="list-style-type: none"> 可能出现中枢神经系统反应，如困倦、无力、头晕、头痛、共济失调、反常兴奋、抗胆碱能副作用，如口干、尿潴留、视物模糊；胃肠道反应，如腹泻、腹痛、食欲异
茶苯海明 Dimen-	口服剂型 50-100 mg/次，每日3-6次。	

【警告/注意事项】有胃溃疡合并症、间质性肺炎的患者慎用。由于本药是对症治疗，停止给药后，有再次复发的可能。



2m. 止血剂 Haemostatics

【不良反应】注射部位疼痛、发热、偶见发硬、瘙痒。全身不良反应偶见心率加重、肺水肿、胸部发紧感、血压下降、脸面潮红、心悸、胃肠道反应、便秘、头晕、头痛、发热、疲乏感、发麻、口腔肿胀感、脱发、四肢疼痛、浮肿、荨麻疹、青光眼或高血压患者的眼压升高、血尿酸增高、转氨酶升高。

悦康通 银杏叶提取物注射液

氨基己酸 Aminocaproic acid

【药物相互作用】避免与血浆扩容剂（如右旋糖苷、明胶制剂）混合后使用。

悦康通 Yue Kang Tong Youcare Pharm

【适应症】纤溶性出血，包括肺出血、肝硬化出血、上消化道出血。

【成份】银杏叶提取物 Extract of Ginkgo Biloba Leaves

预防术中渗血。

依立卢 Eril



【用法用量】口服 成人 2 g/次，依病情服用7-10日或更久。静滴 初始剂量：4-6 g，稀释后于15-30分钟滴完；维持剂量：1 g/hr，日最大剂量20g，可连用3-4日。

【成份】盐酸法舒地尔 Fasudil HCl

【适应症】急慢性脑功能不全及其后遗症、耳/眼部血流及神经障碍、周围循环障碍。

【服药与进食】±①

【用法用量】改善及预防性网膜下腔出血。术前以1:10比例溶于生理盐水、葡萄糖注射液。500 mL输血量，静滴速度应控制在2-4 mL/min。

【用法用量】深部肌注或缓慢静推 每天或每隔1天5 mL。静滴 10-20 mL qd - bid，必要时25 mL bid。给药时可将本品以1:10比例溶于生理盐水、葡萄糖注射液。500 mL输血量，静滴速度应控制在2-4 mL/min。

【禁忌】弥漫性血管内凝血的高凝期、有血栓形成倾向或有血管栓塞性疾病史的患者禁用。注射剂禁用于早产儿。

【警告/注意事项】慎用于心、肝、肾功能不全者、泌尿道术后出血患者以及妊娠妇女。不能阻止小动脉出血，术中如有活动性动脉结扎止血，不可静注。

【警告/注意事项】慎用于心、肝、肾功能不全者、泌尿道术后出血患者以及妊娠妇女。不能阻止小动脉出血，术中如有活动性动脉结扎止血，不可静注。